

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: آزارام
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
• بیماران ام اس ازین دارو بعنوان یک داروی بی ازار یاد کرده و چون عوارض کمی دارد به شدت از ان راضی هستند. • اگر در حین استفاده این دارو بیمار متوجه حالت تهوع شدید شد باید سریعا به پزشک مراجعه کند. • قطع مصرف دارو باید بتدریج انجام گیرد. • در صورت حساسیت به آزاتیوپرین، و بارداری(فقط در درمان روماتیسم) نباید مصرف شود. • در صورت بیماری فعال ویروسی(آبله مرغان و هرپس)، اختلال کبدی، عفونت، پانکراتیت، نارسایی کلیوی و نقص شدید گزانتین اکسیداز، این دارو باید با احتیاط مصرف شود. بین واکسیناسیون و تجویز این دارو فاصله زمانی ۱۲-۶ ماه باید رعایت شود.	

واحد آموزش به بیمار