

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: آزیترومایسین
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• تجویز آزیترومایسین برای کودکان باید با احتیاط و دقت صورت گیرد. • موارد منع مصرف درافرادی که به دارو حساسیت مفرط دارند و موارد احتیاط در افرادی که دچار بیماری های کبدی هستند . • مصرف همزمان آزیترومایسین با فنی توفین، باریتوراتها، کاربامازپین و سیکلوسپورین، خطر مسمومیت با این داروها را افزایش می دهد. • مصرف آزیترومایسین در بیمارانی که از وارفارین استفاده می کنند، زمان انعقاد خون را افزایش می دهد. • عوارض جانبی شامل: سرگیجه، سردرد، ضعف، بیخوابی، طپش قلب، درد قفسه سینه، بثورات جلدی، حساسیت به نور، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، سوء هاضمه، نفخ زردی پوست • آزیترومایسین در بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک تجویز شود. • ایجاد اسهال آبکی بدنبال مصرف دارو باید جدی گرفته شود و باید مصرف دارو قطع گردد. • در بیمارانی که بطور همزمان از داروهای ضد انعقاد خوراکی استفاده می کنند، در طول درمان باید تست های انعقادی انجام گیرد. • سوسپانسیون آزیترومایسین یا سایر اشکال این دارو را با معده خالی (یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا) مصرف نمایید. • بین مصرف این دارو و مصرف آنتی اسید ها حاوی آلومینیوم و منیزیم، باید حداقل دو ساعت فاصله باشد. • دارو را در ظروف در بسته و در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید	

واحد آموزش به بیمار