

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: آسیکلوویر
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: ضد ویروس
• در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، دوز آسیکلوویر باید تعدیل شود. • موارد احتیاط در شیردهی، نارسایی کلیوی، اختلالات کبدی است. • عوارض جانبی شامل سرگیجه، احساس عدم تعادل، بی خوابی، بی قراری، کاهش عملکرد مغزی، گیجی، منگی، توهم، تشنج، سردرد، کرامپ شکمی، تهوع، استفراغ، نفخ و سوء هاضمه • مصرف آسیکلوویر در دوران شیردهی و بارداری ممنوع می باشد. • دوز و روش مصرف آسیکلوویر را مطابق دستور پزشک اجرا کنید. • از دستکاری ضایعات بپرهیزید. • با توجه به هایپرپلازی لثه ها، مراقبت های دهان و دندان را مورد توجه قرار دهید. • روزانه ۲ تا ۳ لیتر مایعات استفاده کنید. • دارو را در درمای اتاق نگهداری نمائید.	

واحد آموزش به بیمار