

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
آمپی سیلین (AMPICILLIN) 	نام دارو: آمپی سیلین
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• موارد منع مصرف درافرادی که حساسیت شدید نسبت به آمپی سیلین و دیگر دارو های این دسته دارند. • موارد احتیاط در افرادی که اختلال عملکرد کلیه و آسم دارند. • آمپی سیلین تاثیر داروهای ضد انعقاد خوراکی را افزایش می دهد. • بدنبال مصرف همزمان آمپی سیلین با آلوپورینول، احتمال بروز بثورات پوستی افزایش می یابد. • آمپی سیلین تاثیر داروهای ضد بارداری خوراکی را کاهش می دهد. • عوارض جانبی شامل تشنج (در دوز های بالا)، اسهال، تهوع، استفراغ، کمخونی واکنش افزایش حساسیت است. • آمپی سیلین بهتر است در بارداری و شیردهی استفاده نشود. • بهتر است کپسول آمپی سیلین با معده خالی (یک ساعت قبل و یا ۲ ساعت بعد از غذا) همراه با یک لیوان آب مصرف شود. • دوره درمان با دارو باید کامل شود. • توصیه می شود هنگام مصرف آمپی سیلین از شیوه های غیر هورمونی برای جلوگیری از بارداری استفاده شود. • سوسپانسیون خوراکی آمپی سیلین را می توان تا ۱۴ روز در یخچال نگهداری نمود. از یخ زدن دارو جلوگیری نمایید. • کپسول باید در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.	

واحد آموزش به بیمار