

	در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلی ۲۹۵
نام دارو: باکلوفن	
موارد مصرف: شل کننده عضلانی	زمان مصرف: براساس دستور پزشک
قبل از مصرف دارو، در صورت مشکلات گوارشی و یا بیماری کلیوی، تشنج، اختلالات خلق، سابقه سکته مغزی و یا لخته شدن خون در رگ‌ها و یا حساسیت دارویی، به پزشکتان اطلاع دهید. این دارو را نباید بطور همزمان با الکل مصرف کرد. در مواردی که نیاز است تا دارو قطع شود، باید بصورت تدریجی انجام گردد. باکلوفن ممکن است احتمال ایجاد کیست‌های تخمدان را افزایش دهد. اگر مصرف یک وعده از دارو را فراموش کرده‌اید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف وعده بعدی باشد دوز مصرفی را دو برابر نکرده و فقط دوز جدید را مصرف کنید. در صورت مصرف، تا ۲ ساعت از رانندگی و سایر فعالیت‌هایی که به تمرکز و هوشیاری کامل نیاز دارند خودداری کنید. مصرف این دارو در سالمندان احتمال وقوع عوارض خواب آلودگی، توهم و گیجی بیشتر است. در بیماران مبتلا به صرع، احتمال افزایش حملات ناگهانی وجود دارد. در آغاز درمان کاهش اسپاستیسی ناشی از دارو ممکن است باعث اشکال در توانایی ایستادن و راه رفتن بیمار و خطر سقوط گردد. در خلال درمان فشارخون، وزن، قندخون و تست‌های عملکرد کبدی را کنترل نمایید.	

