

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: تامی فلو
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• این دارو برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا نمی باشد. • قبل از مصرف اسلتامیویر، در صورت حساسیت به آن یا سایر آلرژی ها به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. • قبل از مصرف این دارو، سوابق پزشکی خود را به ویژه بیماری کلیوی و دیالیز به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. • قبل از جراحی، در مورد کلیه داروهایی که استفاده می کنید (از جمله داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) به پزشک یا دندانپزشک خود صحبت کنید. • در دوران بارداری، این دارو فقط در مواقعی که به وضوح مورد نیاز باشد، باید استفاده شود. در مورد خطرات و فواید آن با پزشک و داروساز خود صحبت کنید. • این دارو به شیر مادر منتقل می شود، قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید. • عوارض جانبی شامل حالت تهوع و استفراغ رخ بدهد. • دارو را به صورت خوراکی با غذا یا با معده خالی مصرف کنید. برای کاهش ناراحتی معده می توانید دارو را با غذا یا شیر مصرف کنید. • این دارو زمانی بهتر عمل می کند که مقدار دارو در بدن در حد ثابت نگه داشته شود. بنابراین دارو را هر روز در فواصل مساوی و سر ساعت مصرف کنید. • مصرف دارو را تا پایان دوره درمان ادامه دهید. چرا که قطع زود هنگام دارو ممکن است باعث شود ویروس همچنان به رشد خود ادامه دهد و منجر به عود عفونت یا عدم حفاظت شما در برابر آنفولانزا شود.	

- اگر ۲ هفته قبل از درمان با این دارو واکسن آنفولانزا استنشاقی دریافت کرده اید، به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو ممکن است تاثیر واکسن آنفولانزا استنشاقی را کاهش دهد.
- قبل از دریافت واکسن آنفولانزا استنشاقی حداقل ۲ روز پس از پایان درمان با این دارو صبر کنید.

واحد آموزش به بیمار