

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: تای سبری (ناتالیزومب)
زمان مصرف: طبق دستور پزشک معمولاً ۳۰۰ میلی گرم انفوزیون وریدی در عرض یکساعت هر ۴ هفته	موارد مصرف: درمان انواع عود کننده مالتیپلاسکلروزیس و بیماری کرون
• ناتالیزوماب خطر ابتلا به عفونت ها از جمله عفونت های فرصت طلب و عفونت های هرپسی جدی را افزایش می دهد. در صورت بروز این عفونت ها درمان با ناتالیزومب قطع شود. • در صورت بروز زردی یا علائم سمیت کبدی مصرف ناتالیزومب قطع شود. • ناتالیزوماب فقط جهت انفوزیون وریدی می باشد و بیمار طی انفوزیون و تا یکساعت پس از اتمام انفوزیون ناتالیزومب تحت مراقبت قرار بگیرد. در صورت مشاهده علائم واکنش ازدیاد حساسیت انفوزیون قطع شود.	

واحد آموزش به بیمار