

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلی ۲۹۵



نام دارو: دلوکستین



زمان مصرف: بر طبق دستور پزشک

موارد مصرف: ضد اضطراب، ضد افسردگی

- اگر ناراحتی معده دارید، این دارو را با غذا یا شیر مصرف نمایید تا باعث تحریک معده نشود.
- دوز روزانه خود را صبح مصرف نمایید تا باعث بیدار شدن شما در طی شب جهت ادرار کردن نشود.
- سعی کنید دارو را هر روز در زمان معینی مصرف نمایید و از قطع ناگهانی پرهیز کنید.
- در طول مصرف دارو علائمی مانند خشکی دهان، سردرد، یبوست، کاهش اشتها، خواب آلودگی یا تعریق ممکن است ایجاد شود، اگر این علائم ادامه داشت یا بدتر شد، حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
- هنگام برخاستن از رختخواب، و یا موقعیت نشسته به ایستاده، آهسته بلند شوید
- مصرف دارو را به دیگران توصیه نکنید