

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۲۱-۰۰۲۳۵۷- داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: دپاکین (والپروات - والپروات سدیم)
زمان مصرف: بر طبق دستور پزشک	مورد مصرف: ضد تشنج، تغییرات روانی شدید، سردرد میگرنی
- اگر مشکلات گوارشی دارید قرص دپاکین را همراه با غذا مصرف کنید - قرص یا کپسول دپاکین را بصورت کامل و بدون جویدن و یا آسیب وارد شدن به پوسته قرص قورت دهید. اگر به لایه بیرونی کپسول دپاکین آسیب وارد شود موجب ناراحتی دهان و گلو خواهد شد. - اگر از دپاکین برای درمان تشنج استفاده میکنید هرگز بدون مشورت کردن با پزشک خود دارو را قطع نکنید. اگر ناگهان دارو را قطع کنید ممکن است که شرایط شما حتی بدتر هم شود. معمولاً پزشکان به مرور دوز دارو را کم کرده و کم کم آن را قطع میکنند. - اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، ریزش مو، دو بینی و تاری بینی، تغییر زمان عادت ماهانه، شنیدن صدا زنگ در گوش ها، لرزش، بی ثباتی و تغییر وزن از عوارض دپاکین میباشد. در صورت بروز، حتما باید به پزشک خود اطلاع دهید. - در صورت درد سینه، کبودی، خونریزی بی دلیل، تغییر در ضربان قلب، ورم دست ها، پا ها، حرکات غیر طبیعی و غیر ارادی چشم ها، احساس سرما کردن، نفس کشیدن سریع و از دست دادن هوشیاری، و اختلال روحی روانی حتماً به پزشک اطلاع دهید - کارت شناسایی مبنی در داشتن صرع و یا مصرف دپاکین همراه خود داشته باشید	