



در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۰۲۱ داخلی

۲۹۵

نام دارو:
دگزامتازون



زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک

موارد مصرف:
کور تیکواستروئیدها

- در صورتی که فشار خون بالا، سابقه ی حمله ی قلبی یا هرگونه ناراحتی قلبی-عروقی و نارسایی کبدی یا کلیوی، سابقه ی خانوادگی دیابت یا بیماری چشمی گلوکوم (آب سیاه)، اختلالات ذهنی، اختلالات تیروئید، صرع و اختلالات انعقادی دارید، پزشک را در جریان قرار دهید.
- دگزامتازون خوراکی را همراه با یک وعده غذایی سبک و یک لیوان آب مصرف نمایید.
- دگزامتازون سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف می کند به همین خاطر در صورت احساس علائم هرگونه بیماری (حتی علائم سرماخوردگی)، لازم است به پزشک مراجعه نمایید.
- مصرف طولانی مدت دگزامتازون بر روی استحکام استخوان ها اثر می گذارد به همین خاطر سنجش تراکم استخوان در بیماران بسیار حائز اهمیت می باشد.
- عوارض گوارشی از جمله درد شکمی، سوء هاضمه و تهوع ممکن است با مصرف این دارو ایجاد شود. مصرف دارو همراه یا پس از وعده غذایی سبک و پرهیز از غذاهای پرچرب و پر ادویه، می تواند از وقوع آنها پیشگیری نماید.

واحد آموزش به بیمار