

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلی ۲۹۵



نام دارو: زولپیدم

زمان مصرف: بر طبق دستور پزشک

موارد مصرف: ضد تشنج، ضد اضطراب و آرامبخش

- زولپیدم به سرعت عمل کرده و به همین دلیل لازم است که حتما حدود نیم ساعت قبل از خواب و در منزل از آن استفاده شود
- قطع مصرف ناگهانی این دارو ممکن است باعث ایجاد تهوع و استفراغ، گر گرفتگی، گرفتگی معده، عصبی شدن و لرزش شود، بنابراین حتما دارو را به تدریج و تحت نظر پزشک معالج قطع کنید.
- زولپیدم، دارویی خواب آور است و لازم است که حداقل تا ۴ ساعت پس از استفاده، از رانندگی و کار کردن با ابزار و ماشین آلاتی که نیاز به هشیاری دارند، خودداری کنید.
- قبل از مصرف دارو حتما پزشک خود را از سایر بیماری های کبدی، کلیوی و ریوی و مشکلات روانپزشکی خود مطلع نمایید
- از مصرف داروی زولپیدم با غذاهای چرب خودداری کنید.
- مادران شیرده باید تحت نظر پزشک مصرف کنند.