

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلي ۲۹۵	
	نام دارو: سفالکسین
زمان مصرف: بر طبق نظر پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
۱. استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط باشد. ۲. برای جذب بیشتر توصیه می‌شود این دارو با معده خالی مصرف شود. (حداقل یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) ۳. افرادی که به انواع پنی سیلین و سایر داروها حساسیت دارند نباید از این دارو مصرف کنند. ۴. مصرف سفالکسین در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. ۵. در صورت بروز تب و اسهال در پی مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید. ۶. در صورتیکه سابقه ابتلا به هر نوع ناراحتی گوارشی یا روده‌ای داشته اید، قبل از مصرف این دارو پزشک را مطلع سازید. ۷. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید؛ ولی چنانچه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است آن را مصرف نکرده و دوز بعدی را دو برابر ننمایید. ۸. در صورت اقدام به هرگونه واکسیناسیون پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید	