

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: سفوروکسیم
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
- موارد احتیاط در سابقه خونریزی گوارشی می باشد. - سفوروکسیم اثر داروهای ضد انعقادی خوراکی (مثل وارفارین) را تغییر می دهد. - عوارض جانبی شامل سرگیجه، سردرد، تشنج، اسهال ، تهوع و کهیر است. - در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت و یا اسهال شدید، مصرف دارو باید قطع شود. - بهتر است سفوروکسیم در بارداری و شیردهی استفاده نشود. - بهتر است قرص سفوروکسیم با معده خالی مصرف شود (حداقل یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا). - در صورتی که بیمار مشکلات گوارشی دارد می تواند داروی سفوروکسیم خوراکی را همراه با غذا مصرف کند. - دوره درمان باید کامل شود حتی اگر فرد احساس بهبودی دارد. - دارو را سر وقت مقرر مصرف نمایید. - قبل از مصرف شیشه حاوی سوسپانسیون خوراکی سفوروکسیم را به خوبی تکان دهید. - برای مصرف سوسپانسیون خوراکی سفوروکسیم از پیمانه داخل جعبه دارو استفاده نمایید تا مقدار مصرف دارو دقیق باشد. - اگر بلعیدن قرص های سفوروکسیم (قرص فارینات) برای بیمار مشکل است، می توان قرص را را خرد کرد و یا مقدار کمی غذا استفاده کرد و برای بر طرف شدن مزه تلخ آن، می توان همراه با آب میوه مصرف نمود - بعد از تهیه سوسپانسیون خوراکی سفوروکسیم، دارو را می توان تا ۱۴ روز در یخچال نگهداری کرد.	

واحد آموزش به بیمار