

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو سفکسیم
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• افرادی که حساسیت شدید به هر یک از انواع پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها دارند از مصرف سفیکسیم اجتناب کنند و در افرادی که به مشکلات کلیوی دچارند باید با احتیاط باشد. • سالیسیلات ها باعث افزایش غلظت سرمی سفیکسیم می شوند. • از جمله عوارض جانبی سفیکسیم (عوارض شربت سفیکسیم) می توان به موارد زیر اشاره کرد: • سرگیجه، سردرد، خارش، کهیر، اسهال، تهوع، استفراغ، نفخ و درد شکم، عفونت تناسلی • بهتر است سفیکسیم در بارداری استفاده نشود. • سفیکسیم در شیر ترشح می شود و بنابراین مصرف سفیکسیم در شیردهی باید همراه با احتیاط باشد. • در صورت ایجاد اسهال شدید، تنگی نفس، واکنش های پوستی و خارش مصرف داروی سفیکسیم را قطع نمائید. • سفیکسیم را می توان قبل و یا بعد از غذا مصرف کرد. • مصرف دارو نباید فراموش شود و حتما در وقت مقرر دارو را مصرف نمایند. • قبل از مصرف سوسپانسیون خوراکی سفیکسیم، شیشه حاوی سوسپانسیون را به خوبی تکان دهید و از پیمانه داخل جعبه دارو استفاده نمایند تا مقدار مصرف دارو دقیق باشد. • دارو را در دمای اتاق نگهداری نمائید.	