

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو سیپروفلوکساسین
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• موارد منع مصرف در حساسیت و کودکان می باشد. • موارد احتیاط در افراد دارای سرعت و تشنج، آرترواسکلروز عروق مغز است • مصرف آنتی اسید ها و نیتروfurانتوین باعث کاهش جذب این دارو می گردد. • عوارض جانبی شامل سردرد، بی قراری، کابوسهای شبانه ، لرزش، عدم تعادل، تشنج، خواب آلودگی، ضعف ، بی اشتها، تهیض قلب ، سنکوپ، افزایش فشار خون،خارش، کهیر، حساسیت به نور، تهوع، اسهال، استفراغ، درد مفاصل، تنگی نفس،تاری دید، دوبینی، طعم ناخوشایند در دهان • مصرف این دارو در بارداری توصیه نمی شود و در سه ماهه اول بارداری منع مصرف دارد. این دارو با غلظت های کم در شیر مادر ترشح می شود. • در صورت لزوم استفاده از آنتی اسید ها در دوره درمان با داروی سیپروفلوکساسین، باید بین مصرف دو دارو حداقل ۴ ساعت فاصله وجود داشته باشد. • توصیه می شود در طول درمان، مایعات فراوان بنوشید. • مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی یا گیجی شود. توصیه می شود تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر اموری که نیاز به هوشیاری دارند، پرهیز نمایید. • توصیه می شود در طول درمان با این دارو، از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خودداری نمایید. • در صورت ایجاد واکنش های آلرژیک، دارو باید بلافاصله قطع شود و به پزشک خود اطلاع دهید. • دارو باید در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود و از یخ زدگی دارو باید جلوگیری شود.	

واحد آموزش به بیمار