

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: فرفولیک (قرص آهن)
زمان مصرف	موارد مصرف: کم خونی
• فرفولیک را با معده خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا همراه با یک لیوان پر آب، مصرف کنید. • در صورت وجود ناراحتی‌های گوارشی، این دارو را همراه با غذا و یا آخر شب قبل از خواب مصرف کنید • برای جذب بهتر فرفولیک، تا دو ساعت بعد از آن داروهای آنتی‌اسید و نیز خوراکی‌هایی مانند قهوه، چای، حبوبات و تخم‌مرغ مصرف نکنید. • مصرف فرفولیک باعث تیره شدن رنگ مدفوع و ادرار می‌گردد. • مصرف همزمان با ویتامین C جذب آهن را افزایش می‌دهد. • در صورت بروز عوارضی مثل درد یا کرامپ شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ، یبوست، سوزش سر دل، تیره شدن رنگ ادرار، خواب‌آلودگی، ضربان ضعیف یا سریع و غیرعادی قلب، به پزشک مراجعه کنید.	

