

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو فسفومايسين
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• قبل از مصرف این دارو، در صورت وجود حساسیت به آن یا آلرژی های دیگر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. • این دارو ممکن است حاوی مواد ی باشد که می تواند باعث بروز واکنش های آلرژیک یا سایر مشکلات شود. • قبل از استفاده از این دارو، سوابق پزشکی خود را، به ویژه در مورد بیماری های کلیوی، با پزشک یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. • در صورت بروز علائم عفونت کلیه (مانند درد در ناحیه پهلو یا ناحیه تحتانی کمر، تب و لرز)، سریعاً پزشک خود را مطلع کنید. ممکن است پزشک معالج شما، درمان را تغییر دهد. • این دارو ممکن است باعث سرگیجه شود. رانندگی نکنید، از ماشین آلات استفاده نکنید یا هر کاری را که نیاز به هوشیاری دارد انجام ندهید تا زمانی که بتوانید با هوشیاری کامل و دقت بالا آن ها را انجام دهید. • مشروبات الکلی را محدود کنید. • این دارو ممکن است حاوی قند باشد. در صورت داشتن بیماری دیابت احتیاط مصرف لازم می باشد. • در حین استفاده از این دارو، واکسیناسیون انجام ندهید، مگر اینکه پزشک دستور داده باشد.	

- قبل از جراحی، در مورد همه داروهای مصرفی خود (از جمله داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) با پزشک یا دندانپزشک خود صحبت کنید.
- در دوران بارداری، این دارو فقط در مواردی که به وضوح مورد نیاز باشد، باید استفاده شود. در مورد خطرات و فواید آن با پزشک خود صحبت کنید.
- این دارو به مقدار کمی به شیر مادر منتقل می شود، اما بعید است که به نوزاد شیر خوار آسیب برساند. قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.
- عوارض جانبی فسفوماپسین شامل اسهال، حالت تهوع، سردرد، ناراحتی های واژن و سرگیجه می باشد.
- در صورت بروز عوارض جانبی جدی از جمله تغییر دید و ضعف غیرمعمول، فوراً به پزشک خود این دارو را به صورت خوراکی معمولاً ۱ بسته (ساشه) به صورت تک دوز یا طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- دارو را قبل از مصرف با آب مخلوط کنید. به این صورت که محتویات ۱ ساشه را درون نصف لیوان آب سرد (۴ اونس یا ۱۲۰ میلی لیتر) ریخته و به هم بزنید تا حل شود؛ سپس بلافاصله همه مخلوط را بنوشید.
- از آب گرم یا داغ استفاده نکنید.
- علائم شما باید طی ۲ تا ۳ روز بهبود یابد.
- اگر وضعیتتان بعد از ۳ روز بهبودی پیدا نکرد یا بدتر شد، به پزشک خود اطلاع دهید.

واحد آموزش به بیمار