



<p>در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱-۰ داخلی ۲۹۵</p>	
	<p>نام دارو فلوکونازول</p>
<p>زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک</p>	<p>موارد مصرف: آنتی بیوتیک</p>
<ul style="list-style-type: none"> • مصرف این دارو با فنی توئین ، ریفامپین، هیدروکلرتیازید و وارفارین باید با احتیاط انجام شود. • عوارض جانبی شامل سردرد، بثورات جلدی، تهوع، استفراغ، اسهال، مشکلات کبدی و شک حساسیتی می باشد. • در بارداری باید با احتیاط مصرف شود. این دارو با غلظت مشابه سرم در شیر مادر ترشح می شود . بنابراین تغذیه با شیر مادر در طول درمان با این دارو، توصیه نمی شود. • جهت کاهش عوارض گوارشی ، دارو را همراه با غذا مصرف نمایید. • درمان با این دارو طولانی مدت است و باید مصرف دارو تا پایان دوره درمانی بطور منظم و دقیق ادامه یابد. • در صورت بروز زردی ، تغییر رنگ ادرار ، بی رنگ شدن مدفوع ، خارش و کاهش حجم ادرار به پزشک مراجعه نماید. • در صورت فراموش کردن دوز دارو در اولین فرصت آن را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوزهای بعدی پرهیز کنید. • دارو را در ظروف دربسته و در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید 	

واحد آموزش به بیمار