

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: پلاویکس
زمان مصرف: در صورت سابقه نوعی درد قفسه سینه یا حمله قلبی، پزشک درمان را با ۳۰۰ میلی گرم پلاویکس (۴ قرص ۷۵ میلی گرمی) شروع می کند و سپس با دوز ۷۵ میلی گرم در روز ادامه می دهد.	موارد مصرف: دسته داروهای قلبی عروقی
• در صورت وجود حساسیت به کلوپیدوگرل یا هر یک از اجزای دارو، ابتلا به خونریزی در اثر بیماری هایی مثل زخم معده یا خونریزی مغزی و بیماری شدید کبدی از مصرف دارو اجتناب گردد. • دارو باید به صورت خوراکی با یا بدون غذا و هر روز در زمان مشابهی مصرف شود. • لازم است مصرف دارو را تا زمانی که پزشک تجویز می کند ادامه دهید. • اگر مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید و تا ۱۲ ساعت بعد از زمان معمول مصرف آن بلافاصله این دارو را مصرف کنید و دوز بعدی دارو را نیز در زمان معمول مصرف نمایید. • در صورت یادآوری دوز فراموش شده پس از گذشت ۱۲ ساعت، فقط دوز بعدی را در زمان معمول آن مصرف کنید و از ۲ برابر کردن دوز دارو برای جبران دوز فراموش شده (مصرف دو دوز به صورت همزمان) خودداری نمایید. • شایع ترین عارضه جانبی ناشی از پلاویکس خونریزی می باشد که ممکن است به صورت خونریزی معده یا روده، کبودی، تجمع خون زیر پوست، خونریزی بینی و وجود خون در ادرار ظاهر کند.	

واحد آموزش به بیمار