

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: پنی سیلین وی
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• پنی سیلین وی تحمل زیادی نسبت به اسید معده دارد و به این علت می توان آن را به صورت خوراکی مصرف کرد بر خلاف پنی سیلین جی که به اسید معده حساس است و سریع در برابر اسید معده از بین می رود. • پنی سیلین وی را حتما باید با معده خالی چند ساعت بعد از صرف غذا مصرف کرد. • به دلیل این که آنتی بیوتیک ها داروهایی هستند که باید دوز دقیقی از آنها را استفاده کرد، بهتر است در مصرف محلول آنتی بیوتیک از همان پیمانه داخل جعبه دارو استفاده شود. • موارد منع مصرف درافرادی که حساسیت شدید به هر یک از انواع پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها دارند. • موارد احتیاط درافرادی که اختلال در عملکرد کلیه دارند. • مصرف غذا، آبمیوه های اسیدی یا نوشابه های گاز دار جذب پنی سیلین را کاهش می دهد. • عوارض جانبی شامل تشنج ، اسهال، کم خونی و کهیر است. • در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت فوری و یا اسهال شدید، مصرف دارو باید قطع شود. • بهتر است در بارداری و شیردهی استفاده نشود. • محلول خوراکی را قبل از مصرف کاملا تکان دهید. • دارو باید در وقت مقرر مصرف شود و دوره درمان علیرغم احساس بهبودی، باید کامل شود. • بعد از آماده سازی، محلول خوراکی را می توان تا دو هفته در یخچال نگهداری نمود.	

واحد آموزش به بیمار