



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی، با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید.
۲۱-۰۰-۲۳۵۷۰ داخلی ۲۹۵

نام دارو:
کاربامازپین



موارد مصرف: ضد
صرع
زمان مصرف: طبق دستور پزشک

-این دارو با نام های تجاری:

تگرتول، کاربام در دوز های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم عرضه میگردد.

-جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

- از قطع ناگهانی مصرف دارو اجتناب و در صورت لزوم مقدار مصرف دارو باید به تدریج کاهش یابد تا از بروز تشنج یا حمله مداوم صرعی جلوگیری شود.

-در صورت مصرف این دارو در موقع رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت و هوشیاری دارند باید احتیاط نمود.

- دوره درمان با دارو باید کامل شود. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده نیز باید خودداری گردد.

- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری نموده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر شود. در صورت فراموش کردن بیش از یک نوبت مصرف دارو باید به پزشک مراجعه شود.

- به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.

-قطع ناگهانی مصرف دارو در بیمارانی که به این دارو پاسخ می دهند، ممکن است منجر به بروز تشنج و صرع شود

-عوارض جانبی کاربامازپین:

تهوع، استفراغ، گیجی، خواب آلودگی، سردرد، عدم تعادل، توهم و آشفتگی، اختلالات بینایی، اسهال و بیوست، بی اشتهایی و بثورات جلدی گذرا

واحد آموزش به بیمار