

در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵	
	نام دارو کلاریترومایسین
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• موارد منع مصرف در حساسیت مفرط و مصرف آستمیزول است. • مصرف همزمان این دارو با وارفارین باعث طولانی شدن زمان انعقاد خون در بیمار می شود. • عوارض جانبی شامل سردرد، اسهال، تهوع، طعم غیرطبیعی در دهان، سوء هاضمه، درد شکم می باشد. • مصرف این دارو در بارداری توصیه نمی شود. • دارو را می توان قبل، بعد و یا همراه غذا مصرف نمود. • دوره درمان باید کامل شود. • دوز فراموش شده را بلافاصله پس از بخاطر آوردن، مصرف نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن خودداری نمایید و دوز بعدی را دو برابر نکنید. مصرف دوزهای باقی مانده را با فواصل منظم و یکنواخت در طول روز ادامه دهید. • در صورت بروز یثورت جلدی و سایر علائم واکنش افزایش حساسیت به پزشک خود اطلاع دهید. • در صورت دفع مدفوع آبکی و یا اسهال حتی بعد از اتمام دوره درمان به پزشک خود اطلاع دهید. • سوسپانسیون دارو را بعد از تهیه تا دو هفته می توان نگهداری کرد. • دارو را در ظروف در بسته و در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.	

واحد آموزش به بیمار