


در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱- داخلی ۲۹۵	
	نام دارو کوتریموکسازول
زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک	موارد مصرف: آنتی بیوتیک
• مصرف بیش از اندازه کوتریموکسازول می تواند موجب بروز علائمی از قبیل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، گیجی، تورم صورت، سردرد، کاهش فعالیت مغز استخوان، تشنج می گردد. • برای درمان مسمومیت ناشی از مصرف بیش از اندازه کوتریموکسازول باید بلافاصله معده بیمار تخلیه شود و درمان های حمایتی و علامتی نیز اهمیت دارد. • در طول بارداری و شیردهی و نوزادان زیر ۲ ماه منع مصرف دارد. • موارد احتیاط در افراد مبتلا به ایدز، اختلال خفیف کلیه و کبد، دستگاه ادراری، آسم و فاویسم است. • این دارو اثرات داروهای پایین آورنده قند خون و داروهای ضد انعقاد خوراکی را افزایش می دهد. • مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی توصیه نمی شود. • دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف نمائید و در طول درمان آب و مایعات فراوان بنوشید. • توصیه می شود، علیرغم احساس بهبودی، دارو را مطابق دستور بکار برده و در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس از بخاطر آوردن، دارو را مصرف نمائید. مگر این که زمان مصرف دوز بعدی رسیده باشد. • در صورت بروز اسهال به پزشک اطلاع دهید. • از مصرف خودسرانه داروهای دیگر با کوتریموکسازول خودداری نمائید و در صورت نیاز باید با پزشک مشورت شود. • دارو را در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و در محیط خشک و دور از نور، نگهداری نمائید	

واحد آموزش به بیمار