

در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۳۵۷۰-داخلی ۲۹۵	
	نام دارو: سولفیناسین / یوریناسین
زمان مصرف: بر طبق دستور پزشک	موارد مصرف: بی اختیاری ادرار، تکرر ادرار
این دارو باعث کاهش انقباضات مثانه می شود و این امکان را می دهد که حجم بیشتری از ادرار را در خود جای داده در نتیجه تعداد دفعات ادرار کردن را کم می کند و از بی اختیاری ادرار می کاهد. این دارو در افرادی که احتباس ادرار دارند، منع مصرف دارد. ممکن است ۴-۶ هفته زمان ببرد تا اثرات این دارو نمایان شود. مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه، چای، شکلات و نوشابه علائم شما را تشدید می کند. عوارض جانبی این دارو شامل: خشکی دهان، یبوست، افزایش فشار خون، سردرد، عوارض گوارشی، خستگی، احتباس ادراری و خشکی چشم می باشد. در صورت بروز هرگونه از این علائم به پزشک خود اطلاع دهید	